

Serie de Casos de Sarcomas de Ewing en un hospital terciario en 5 años

L. Ventura, M. Lorite, J.A. Salinas, F. R. Aguirre. S. Navarro, E. García.
Hospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca, Islas Baleares, España




AEP I CONGRESO DIGITAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2020




CARACTERÍSTICAS

Paciente	Sexo	Raza	Edad al diagnóstico	Localización	Tipo	Resección
1	Masculino	Caucásica	6 años	Típico	Óseo	Si
2	Masculino	Caucásica	5 años	Atípico	Extra-óseo	Si
3	Masculino	Caucásica	13 años	Atípico	Extra-óseo	Si
4	Masculino	Caucásica	13 años	Atípico	Óseo	Si
5	Femenino	Caucásica	5 años	Atípico	Óseo	Si
6	Masculino	Caucásica	11 años	Típico	Óseo	Si
7	Masculino	Caucásica	13 años	Atípico	Óseo	No
8	Femenino	Etíope	11 años	Típico	Óseo	No

LOCALIZACIÓN



TIPO DE SARCOMA



GENÉTICA



SÍNTOMAS




Paciente	Dolor	Traumatismo inicial	Fractura patológica	Cojera	Inflamación	Pérdida de peso	Fiebre
1	si	no	no	si	si	no	si
2	si	si	no	no	no	no	no
3	si	no	no	no	no	no	no
4	si	no	no	si	si	no	no
5	no	no	no	no	no	no	no
6	si	no	si	si	no	no	no
7	si	si	no	no	si	no	no
8	si	no	no	si	si	si	no


SARCOMA DE EWING EXTRAÓSEO INTRAMEDULAR



SARCOMA DE EWING EXTRAÓSEO SUBLINGUAL



SARCOMA DE EWING DE CALOTA




ANÁLISIS



Paciente	Demora del diagnóstico	Volumen Inicial (mL)	Reducción (mL)	Reducción (%)	Volumen tras QMT (mL)	Metástasis/Exitus
1	6 meses	97	75	77,32	22	No
2	1 meses	3,8	3,8	*	0	No
3	6 meses	35,99	35,99	*	0	No
4	2 meses	85	30	35,29	55	No
5	2 meses	152,1	152,1	*	0	No
6	0,5 meses	22,46	20,68	92,07	1,78	No
7	8 meses	97,72	49,65	50,81	48,07	Si
8	5 meses	269	192	71,38	77	No

* No hay datos por exéresis completa pre-quimioterapia.





AEP I CONGRESO DIGITAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

