

ABDOMEN AGUDO Y SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO

PEDIÁTRICO ASOCIADO A SARS COV-2:

UNA ASOCIACIÓN A TENER EN CUENTA

Diez Martín, Eva; Bedialauneta Somoza, Oihane; Satrustegi Aritziturri, Miren; Hernández Dorronsoro, Unai; Servicio de Pediatría H.U. Donostia.
Roman Moleón, Marina; Urbistondo Galarraga, Alexander; Villalon Herrero, Flor de Nieve; Servicio de Cirugía Pediátrica H.U. Donostia.

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal es común en el paciente con **síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a SARS CoV-2** (SIM-PedS) presentándose en ocasiones como un cuadro de abdomen agudo. pero, a diferencia de otras etiologías, el manejo puede ser médico sin requerir cirugía. Presentamos 3 casos con SIM- Peds que al diagnóstico presentaron un cuadro compatible con abdomen agudo.

RESUMEN DE LOS CASOS

		CASO 1	CASO 2	CASO 3
EDAD		10 años	8 años	11 años
ANTECEDENTES		Familiar SARS-CoV2 + 3 semanas antes	SARS-CoV2 + hace 3 semanas	SARS-CoV2 + hace 1 mes
CLÍNICA		Fiebre + dolor abdominal moderado + vómitos	Fiebre + dolor abdominal moderado + vómitos	Fiebre + dolor abdominal moderado + vómitos + hipotensión e hiperemia conjuntival
EXPLORACIÓN FÍSICA		Dolor abdominal a la palpación en FID + Defensa abdominal		
ECOGRAFÍA		Apéndice 5 mm	Apéndice en límite superior	Ileítis Dilatación de coronaria izquierda
ANALÍTICA SANGUÍNEA		Elevación RFA Trombopenia Linfopenia	Elevación RFA Trombopenia Linfopenia	Elevación RFA Neutrofilia Coagulopatía Elevación de enzimas cardiacas
TRATAMIENTO	QUIRÚRGICO	Apendicetomía; sin hallazgos	NO	NO
	MÉDICO	Ante empeoramiento clínico: Inmunoglobulinas Corticoterapia	Inmunoglobulinas Corticoterapia	Inmunoglobulinas Corticoterapia AAS

CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS

El dolor abdominal en un síntoma común en el niño con SIM-PedS pudiendo aparecer de manera precoz en la evolución. Es necesario, en la situación epidemiológica actual, mantener una elevada sospecha ante un cuadro de abdomen agudo en un paciente con antecedente de infección por SARS CoV-2 o contacto con un caso, con el fin de realizar un diagnóstico adecuado y evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias.