

Riesgo social en el recién nacido. ¿En qué medida afecta a su desarrollo?

M^a Isabel Bueno Redolat, Mireia Vallés Arenes, Núria García Carbonell , Rafael Gómez Zafra

Servicio de Pediatría, Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- La problemática social ya desde el embarazo supone un reto para la Pediatría Social debido a las repercusiones clínicas y sociales que puede ocasionar en los niños.

OBJETIVOS

- Describir las características perinatales e identificar factores de riesgo en pacientes identificados como vulnerables en nuestro hospital.
- Valoración del seguimiento pediátrico en los primeros 6 meses de vida.



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio
y
grupos

COHORTES, PROSPECTIVO, OBSERVACIONAL Y ANALÍTICO

- **Grupo de riesgo social:** RN cuyas madres o ellos mismos presentaran aviso a Trabajo Social (n= 46).
- **Grupo control:** RN seleccionados aleatoriamente sin avisos a Trabajo Social (n= 46).

Variables

Maternas, clínicas, epidemiológicas, sociales, seguimiento en atención primaria y en consultas especializadas, estado vacunal y nutricional.

Análisis
estadístico


SPSS



RESULTADOS

- VARIABLES MATERNAS

	Grupo riesgo social	Grupo control	p valor
Edad materna	26,1 ± 7,1 años	31,6 ± 5,7 años	P=0,001
Control embarazo	Normal 39% Parcial 52% No 9%	Normal 100%	P=0,001
Consumo tóxicos	30,4 %	10,8 %	P=0,02



RESULTADOS

- **VARIABLES CLÍNICAS :**

- **AL NACIMIENTO:**

	Grupo riesgo social	Grupo control	p valor
Sexo, Apgar, somatometría	No existen diferencias entre ambos grupos		
EG <36 semanas	14%	2%	P=0,039
Alimentación con LM	54 %	80%	P=0,028

RESULTADOS

- **VARIABLES CLÍNICAS :**


- **PERINATAL:**

	Grupo riesgo social	Grupo control	p valor
Ingreso en neonatos	n=16 (35%)	n=7 (15%)	P=0,026
Duración	7,31 ± 4,9 días	3,25 ± 1,5 días	P=0,013
Diagnósticos	PT y BP al nacimiento (44%) Problema social (30%) Gestación mal controlada (40%) Madre consumidora de tóxicos (40%)	Policitemia (43%) Ictericia (29%)	P=0,02

RESULTADOS

- VARIABLES SOCIALES

Motivo de notificación a TS



RESULTADOS

- **VARIABLES SOCIALES**

- Al realizar análisis comparativo por subgrupos, no existen diferencias en cuanto a la evolución del RN según el motivo de notificación
- Retirada de la custodia a los progenitores: **8,7%**

- **EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE 6 MESES**

	Grupo riesgo social	Grupo control	p valor
Estado nutricional y vacunación financiada	No existen diferencias entre ambos grupos		
Vacunación no financiada (RV y MenB)	26%	67%	P=0,001
Atención hospitalaria	30%	10%	P=0,02
Falta asistencia a consultas	26%	2%	P=0,01

CONCLUSIONES

- Los hijos de mujeres con riesgo social presentan una mayor proporción de factores (prematuridad, menor tasa de lactancia materna, bajo peso, mal seguimiento clínico, falta de acceso a inmunización no financiada) que pueden comprometer un adecuado desarrollo.
- Resulta crucial identificar precozmente los casos de riesgo social para asegurar un correcto abordaje del neonato y establecer un programa de apoyo a la familia.

¡MUCHAS GRACIAS!

