

Ránula, una patología benigna que puede comprometer la alimentación

David Molina Herranz^a, Amelia Moreno Sánchez^a, Irene Antoñanzas Torres^a, Ana Calabuig Adobes^a, Belén Salinas Salvador^a, Gema Carmen Marcén^a, María Violeta Fariña Jara^a, Cristina Bardella Gil^b.

^aHospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. ^bCentro de Salud Fuentes de Ebro, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

Mucocele y ránula son términos para definir los pseudoquistes asociados a extravasación de moco o saliva de las glándulas salivales a los tejidos blandos. Ocurren como resultado de obstrucción, inflamación o traumatismo local previos del ducto glandular. Los mucocelos aparecen en las glándulas salivales menores como una pequeña tumoración de consistencia blanda y aspecto transparente, rosado o azulado, predominante en la mucosa del labio inferior. Relleno de sialomucina, un líquido filante y transparente. Se recomienda su escisión quirúrgica, aunque últimamente la tendencia es mantener actitud conservadora, ya que pueden tener resolución espontánea.

Las ránulas son mucocelos que se manifiestan como una tumoración no dolorosa en el suelo de la boca y afectan principalmente a glándulas sublinguales.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Neonato de 26 días que consulta por primera vez por rechazo de la ingesta, relacionado con aumento progresivo de quiste en el suelo de la boca presente desde el nacimiento. La lesión se localiza en la zona inferior de la lengua, de color azulado, con 1'5 cm de diámetro. Dado el compromiso de la alimentación producido por el aumento de tamaño se realiza punción del mismo, obteniendo un material líquido transparente.



Posteriormente presenta recurrencia de este episodio una vez al mes durante varios meses, precisando punción y drenaje, por lo que es valorada por Cirugía Maxilofacial. Dada la evolución y la dificultad que supone para la alimentación de la paciente, se realiza finalmente exéresis de la lesión al año de edad, previa realización de resonancia magnética compatible con mucocele. La biopsia describe mucosa lingual con lesión quística revestida por epitelio escamoso y cilíndrico compatible con quiste mucoso ductal.

DISCUSIÓN

Los problemas de alimentación en los recién nacidos y lactantes constituyen un motivo de consulta frecuente. En la práctica, los mucocelos casi nunca son considerados un problema clínico y se resuelven de forma espontánea. No obstante, en recién nacidos pueden comprometer la alimentación, precisando en ocasiones tratamiento quirúrgico.