

UNA ANAFILAXIA INESPERADA

Autores: L. E. Martínez Cano, A. Rivas Oural, L. C. Company Arciniegas, I. Prieto Gómez, V. Redondo Cervantes, M. Bustelo Fernández, N. Carreira Sande, J. D. Moure González, C. García Magán

Centro: Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Introducción

Los corticoides son fármacos antiinflamatorios ampliamente utilizados en el tratamiento de múltiples patologías o situaciones clínicas. Describimos un caso de reacción de hipersensibilidad inmediata al esteaglato de prednisolona, reacción muy poco frecuente en niños, pero potencialmente grave.

Caso clínico

Niña de 5 años con antecedentes de dermatitis atópica y asma, que acude al Servicio de Urgencias por tos y sibilancias, en contexto de crisis de broncoespasmo moderada. Había estado recibiendo salbutamol inhalado en domicilio. A su llegada al Servicio de Urgencias, se administra salbutamol inhalado y esteaglato de prednisolona oral, presentando a los 10 minutos, mayor intensidad de la tos y de la dificultad respiratoria, junto con hipoxemia, edema palpebral bilateral y prurito generalizado.

Ante anafilaxia, se administra oxigenoterapia mediante mascarilla con reservorio y adrenalina intramuscular, presentando mejoría evolutiva en horas sucesivas. Había recibido con anterioridad prednisolona y dexametasona oral en una ocasión.



Estudios complementarios

De forma inmediata se realizó determinación seriada de triptasa en sangre, en el que se identificó un incremento de la misma con normalización de valores en 24 horas.

A las 8 semanas de la reacción, se completa estudio con test cutáneos a corticoides (prick test e intradermorreacción), test de activación de basófilos a corticoides y se realiza prueba de exposición controlada a alternativa (dexametasona), que tolera sin reacción.

Conclusiones

Las reacciones de hipersensibilidad inmediata a corticoides son raras, pero pueden llegar a ser muy graves. Un exhaustivo estudio alérgico permitirá determinar qué corticoides puede recibir la paciente en caso de necesidad, situación probable dada su patología de base.