

Caso clínico: Úlcera de Lipschütz

Ilenia Pérez Figaredo. EIR de Enfermería Pediátrica. Hospital Universitario Central de Asturias

Descripción del caso

Se presenta el caso de una niña de 11 años que trae la madre al servicio de urgencias en enero de 2022 por una úlcera genital de 1 mes de evolución que no remite. Se realiza el triaje y se observan constantes dentro de la normalidad. Estadio Tanner 2. No refiere menarquia ni inicio de relaciones sexuales. Estado vacunal al día.




Fuente: obtenido de Moreira, Casuriaga, Giachetto y Machín .³

La úlcera de Lipschütz o úlcera vulvar aguda es una entidad clínica que se caracteriza por fiebre, astenia, mialgias, cefalea, úlcera genital y linfadenomegalia en mujeres jóvenes


Objetivo

Identificar los cuidados de enfermería en un paciente pediátrico con úlcera de Lipschütz empleando la taxonomía NANDA, NOC y NIC.

Metodología



Resultados



La paciente fue dada de alta a su domicilio con tratamiento antibiótico para tratar la posible sobreinfección que se evidenció en la exploración, así como tratamiento analgésico. Se derivó para seguimiento por su pediatra en atención primaria, por tanto, no se pudo realizar un seguimiento posterior del estado de la niña por las características del servicio de urgencias.

Discusión

Esta úlcera se trata de un cuadro clínico poco común que afecta a las niñas y a su círculo familiar. Es preciso dar a conocer este caso para mejorar el abordaje terapéutico y poder brindar unos mejores cuidados enfermeros adecuados a las necesidades del paciente y su familia.

Asimismo, es importante informar de que la úlcera de Lipschütz no se trata de una enfermedad de transmisión sexual y que las lesiones tienen una curación espontánea, sin secuelas a corto o largo plazo.

Referencias bibliográficas

