



Cuidados de Enfermería en el paciente pediátrico con síndrome Stevens-Johnson

Sánchez Bello S, Beruete Luján C, Bretos Unanue L
Residentes de Enfermería Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

INTRODUCCIÓN


El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es una enfermedad inflamatoria aguda asociada a una reacción de hipersensibilidad, secundaria a la administración de ciertos fármacos o procesos infecciosos. Presenta un período prodrómico de uno a catorce días caracterizado por fiebre, astenia, cefaleas, mialgias, artralgias, odinofagia y tos. Posteriormente se produce la afectación cutánea y mucosa, provocando lesiones papulares eritematosas en diana con desprendimiento de la epidermis en un 10%. Su forma más grave es la necrolisis epidérmica tóxica. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y se confirma mediante biopsia de piel. Se utiliza la escala Scortten para evaluar su pronóstico.

Incidencia de **1,2 a 6** casos por millón de personas-año

20% del total en la edad pediátrica

5% mortalidad en población pediátrica

OBJETIVOS



METODOLOGÍA



Revisión bibliográfica en bases de datos científicas entre Febrero y Marzo 2022



Stevens-Johnson syndrome, nursing care, child y pediatric asociadas mediante el operador booleano AND




Idioma inglés y castellano publicados en los últimos 5 años centrados en el abordaje de la enfermedad en la edad pediátrica




Baja calidad metodológica o de tipo estudio de casos

RESULTADOS



INTERVENCIONES ENFERMERAS



CONCLUSIONES

La medida más importante es la identificación y retirada precoz del agente causal para evitar la progresión de la enfermedad, complicaciones y secuelas. Se precisa una mayor estandarización de los cuidados enfermeros en este tipo de pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

