

Inmunoterapia oral con huevo horneado

MF González Germán; V Buitrago García; P Silvera Roig; L García Martín; S Quevedo Teruel; T Bracamonte Bermejo; L Echeverría Zudaire.

Hospital Universitario Severo Ochoa

1. Introducción

- Huevo: alergia alimentaria frecuente
- Tratamiento:
 - 1. Evitación
 - 2. Inmunoterapia: huevo crudo, cocido, horneado...



Objetivo: evaluar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia oral con huevo horneado en niños con alergia a huevo.

2. Material y métodos

Estudio descriptivo prospectivo (mayo 2017 – julio 2021)

- Prick cutáneo a componentes de huevo y diluciones
- Medición de IgE total, IgE específica a componentes de huevo, y eosinófilos.

6 meses

12 meses

24 meses

ITO según **protocolo**: galletas → empanados → bizcocho

3. Resultados

Total: 36 pacientes

Mediana edad: 4 años (1-8)


Antecedentes personales:

- Dermatitis atópica (77.8%)
- Asma (52.77%)
- Otras alergias alimentarias (52,77%)


21 pacientes PPO huevo cocido: +

Distribución por sexo

■ Varones ■ Mujeres




3. Resultados




Eficacia 91.66% del total)

3. Resultados


Prick



IgE específica



Con respecto a la seguridad de la ITO...



4. Conclusiones

ITO con HH: alternativa segura y eficaz

$\frac{1}{4}$ tolera huevo cocido

Posibilidad de reacciones anafilácticas:
unidades experimentadas