

PÚRPURA DE SCHÖNLEIN-HENOCH, UNA FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA


Marta Alcaide Sarabia¹, Ana Madrid Pinilla², Elena Resa Serrano¹, Jorge García Carreras¹, Carla Pascual Morcillo¹, Miguel Matamala Morillo²

1. MIR Pediatría en Hospital General La Mancha Centro

2. FEA Pediatría en Hospital General La Mancha Centro


INTRODUCCIÓN

VASCULITIS



- * Más frecuente en la infancia
- * Pequeño vaso: leucocitoclasia y depósito de complejos inmunes de IgA1 en la pared vascular
- * Sistémica

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS




- * Púrpura palpable (sin coagulopatía ni trombocitopenia): criterio obligado
- Además debe cumplir uno de los siguientes
- ☒ Artralgias o artritis
 - ☒ Dolor abdominal
 - ☒ Afectación renal



La afectación cutánea ampollosa es infrecuente en la infancia, apareciendo en menos del 2% de los casos.

CASO CLÍNICO

Niña de 3 años




Consulta por lesiones purpúricas de contenido vesicular en ambos miembros inferiores. Rechaza apoyo para deambulación por artralgias. Afebril. No dolor abdominal ni hematuria. Presenta síntomas catarrales la semana previa.



- Hemograma, coagulación, función hepática y renal: Sin alteraciones
- Tira reactiva de orina y sistemático: sin alteraciones
- Serologías: Virus de Epstein-barr Ig M positivo



Ingreso hospitalario para analgesia + curas por cirugía pediátrica de lesiones necróticas



Evoluciona favorablemente, mantiene sistemáticos de orina normales y mejoría de lesiones cutáneas

CONCLUSIONES

- En la púrpura de Schönlein-Henoch, las lesiones ampollosas son una manifestación cutánea infrecuente. No existe evidencia de que se asocie a peor pronóstico o mayor riesgo de complicaciones.
- El diagnóstico es clínico, aunque la presencia de estas lesiones obliga a realizar pruebas complementarias para descartar otras patologías, pudiendo ser necesaria la biopsia cutánea para el diagnóstico definitivo. *La biopsia cutánea se puede evitar cuando se cumplen los criterios diagnósticos de PSH*
- El uso de corticoides es controvertido. Están indicados en casos de dolor articular o abdominal intenso.

En general, esta entidad puede manejarse de forma conservadora como la púrpura de presentación habitual.