

## FIBROMATOSIS COLLI: A PROPÓSITO DE UN CASO DE LESIÓN CERVICAL NEONATAL.

**Autores:** Solano Sánchez R, Ortiz Palacios M, Senis Arranz A, Dominguez Jimenez M, Pozuelo Monfort A, Alcaraz Saura M.

### INTRODUCCIÓN

La fibromatosis colli o tortícolis muscular congénita, es una patología caracterizada por fibrosis del músculo esternocleidomastoideo (ECM) que se presenta como una tumoración cervical. Es típica del neonato y debe reconocerse precozmente para proporcionar tratamiento.

### CASO CLÍNICO

Neonato de 25 días remitido por tumoración cervical izquierda. Afebril, sin otra sintomatología. Entre los antecedentes destaca un parto a término instrumentado con espátulas. En la exploración se objetiva desviación facial hacia la derecha y una masa cervical izquierda de 3 cm, dura y móvil, sin eritema en piel supradyacente, no caliente ni dolorosa. Entre las exploraciones complementarias se solicita una ecografía cervical que informan como masa sólida lobulada que ocupa gran parte del ECM izquierdo, con fina vascularización interna, sugestiva de fibromatosis colli. Con este diagnóstico, se inicia tratamiento rehabilitador consiguiéndose resolución completa y sin secuelas.

### DISCUSIÓN

La fibromatosis colli es una masa cervical benigna que se debe a una hiperplasia fibroblástica que infiltra el ECM. Clínicamente se presenta como una masa cervical firme, no dolorosa, de crecimiento lento que habitualmente ocurre en las primeras semanas de vida. Suele ser unilateral y más frecuente en varones. Su etiopatogenia es desconocida aunque se ha asociado con parto traumático. El diagnóstico precoz es fundamental para evitar complicaciones (plagiocefalia, pérdida de movilidad cervical...).

Las técnicas de imagen pueden ser de gran ayuda en su evaluación y diagnóstico diferencial. El tratamiento suele ser conservador mediante rehabilitación y su evolución natural es el crecimiento durante semanas, seguido de resolución espontánea en el curso de 6 meses.

