



COJERA EN NIÑA DE 2 AÑOS: UN DIAGNÓSTICO INESPERADO

Blanca Díaz-Delgado Menéndez, Rosa Alcobendas Rueda, Manuel Parrón Pajares, Claudia Millán Longo, Celia Muñoz Gómez, Clara Udaondo Gascón, Agustín Remesal Camba, Sara Murias Loza, Atilano José Carcavilla Urqui.
Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid, España

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes se caracteriza por una necrosis avascular de la cabeza femoral. Afecta generalmente a varones de entre 3-8 años. La afectación bilateral es rara y cuando sucede es asimétrica. En todo paciente con afectación de ambas caderas, otros **procesos menos frecuentes deberían ser descartados**.

RESUMEN DEL CASO



❖ **Historia actual:** Niña de 2 y 10 meses que acude a consulta derivada por presentar episodios de cojera intermitente, de predominio derecho, desde los 2 años de edad.

❖ **Exploración física :** marcha normal. No limitación, dolor ni tumefacción a ningún nivel. No puntos dolorosos.

❖ **Pruebas de imagen:**


❖ Ecografía de caderas: no se aprecia derrame articular.

❖ Radiografía de pelvis: **epífisis femorales de pequeño tamaño, irregulares con retraso en la osificación bilateral**, compatible con enfermedad de Perthes o Meyer.




Reinterrogando...


❖ **Antecedentes familiares:** numerosos casos con diagnóstico de Perthes, talla baja, así como **artroplastia articular precoz** (< 30 años de edad) en familiares de hasta 3º grado en rama materna, la mayoría de ellas de cadera, pero también de rodillas.



Se deriva a
Endocrinología
pediátrica que
amplia estudio con:



Serie ósea: epífisis pequeñas, algunas con alteración de la densidad, compatible con displasia epifisaria múltiple.



Estudio genético: **mutación gen MATN3.- Displasia epifisaria múltiple tipo 5**

COMENTARIOS

- La **DISPLASIA EPIFISARIA MÚLTIPLE** es una de las osteocondrodisplasias más frecuentes, presenta herencia autosómica dominante.
- En ella se afecta el desarrollo de diversos centros de osificación epifisaria, mostrando los pacientes episodios de dolor y cojera por afectación en rodillas y caderas desde corta edad.
- La talla baja, inicio temprano de los síntomas, hallazgos radiográficos bilaterales, así como los antecedentes familiares deberían ser tenidos en cuenta para sospechar esta entidad.