

Comorbilidad neurológica y efectos adversos asociados a fármacos en el tratamiento del TDAH

Belén Gallego Calvo

Residente de 1º año del Hospital Universitario Infanta Elena

AEP Junio 2022

1. OBJETIVOS

#01

OBJETIVO PRINCIPAL

Describir las características de nuestros pacientes TDAH: comorbilidades neurológicas, necesidad de fármacos y aparición de efectos adversos

#02



OBJETIVOS SECUNDARIOS

Identificar una posible correlación entre comorbilidad y el resto de elementos bajo estudio (características, fármacos, efectos adversos)

2. RESULTADOS (1/4)

DEL TOTAL DE CONSULTAS, EL 12% SE SELECCIONÓ PARA ESTUDIO...

...SIENDO LOS TDAH + COMUNES EL INATENTO & COMBINADO





2. RESULTADOS (2/4)

EN LOS TDAH ESTUDIADOS, IDENTIFICAMOS 4 CARACTERÍSTICAS CLAVE



6-9 años de edad



son varones



45% vienen con valoración escolar previa

2. RESULTADOS (3/4)

6 DE CADA 10 TDAH TIENEN ADEMÁS OTRAS CORMOBILIDADES NEUROLÓGICAS




TDAH + CORMOBILIDADES



TDAH

Tipo de cormobilidad neurológica



2. RESULTADOS (4/4)

9 DE CADA 10 RECIBÍAN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (principalmente metilfenidato)




TDAH + FÁRMACOS



TDAH

Tipo de fármaco



3. CONCLUSIÓN

HAY CORRELACIÓN ENTRE CORMOBILIDADES/FÁRMACOS & EFECTOS ADVERSOS, PERO DEBEMOS PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO

Hay correlación

- ✓ Si el paciente tiene **TDAH + otra cormobilidad, es más frecuente** la aparición de **efectos adversos** que si tuviera solo TDAH (57%)
- ✓ Si el paciente recibe **tratamiento farmacológico, es mucho más frecuente** la aparición de **efectos adversos** que si no recibe (92%)

No hay correlación

- × Efectos adversos & edad del paciente
- × Efectos adversos & necesidad de fármacos

Próximos pasos

- **Profundizar en el estudio analizando las diferencias** evolutivas de los pacientes **según cómo se diagnosticó el TDAH:**
 - Tras una entrevista clínica en consulta
 - Tras la realización de los tests neuropsicológicos

¡MUCHAS GRACIAS!