

Atención al abuso sexual infantil: experiencia de un hospital terciario

Clara Nieto, Rosa López-Martínez, Paula Rodríguez-Molino,

Marta Bueno, Ana de Vicente, Talía Sainz

Unidad de Pediatría Social y Unidad de Trabajo Social

Servicio de Pediatría General y Servicio de Urgencias



Hospital Universitario La Paz
Hospital de Cantoblanco
Hospital Carlos III



Introducción





- Según la OMS un 20% de niños sufren ASI antes de los 17 años.



- En España 10-20%.

800.000 y 1,6 millones

DENUNCIA



Objetivo


- Describir las características sociodemográficas y clínicas de los casos de ASI diagnosticados en el H. La Paz y analizar el valor de las pruebas microbiológicas en el manejo.

Metodología


- Estudio descriptivo retrospectivo unicéntrico (H.U.L.P.).
- Criterios de inclusión:
 - ≤ 16 años
 - Atendidos tras un ASI/ agresión en el S. Urgencias o en consultas.
 - Entre 2011 y 2020
- Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y de despistaje de ITS.

Resultados

- Se incluyeron a 114 pacientes
- Tendencia ascendente







Evolución temporal de los abusos/agresiones sexuales



Resultados

- VÍCTIMA


- Mujer
- Española
- Adolescente





Resultados

- AGRESOR
 - Hombre
 - Mayor de edad.


TODOS HOMBRES



Nº AGRESORES



Entorno familiar




Resultados

• CONTACTO


- Vaginal
- Sin lesiones
- Una única exposición.
- Sin sustancias psicotrópicas.

TIPO DE CONTACTO




LESIONES


■ Sin lesiones ■ Lesiones vaginales ■ Lesiones anales



EXPOSICIÓN




SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS




Resultados

- Pruebas microbiológicas: 81% de los pacientes.
 - Todas las serologías fueron negativas.
 - En 12 pacientes se objetivaron ITS (10.5%).



Cultivos y/o PCR	Serologías
• Exudado vaginal • E. faríngeo • E. anal • Orina	• VIH • VHB • VHC



Resultados

SEGUIMIENTO


Primera
semana

Al mes

A los 4-6
meses


- Infecciones de transmisión sexual:
 - Un 65% consultaron en las primeras 72 horas.
 - 62 pacientes recibieron profilaxis antimicrobiana. Pauta más utilizada ceftriaxona + azitromicina.
 - 45 pacientes recibieron PPE frente a VIH. La pauta más utilizada fue Tenofovir + Emtricitabina + Raltegravir 28 días.

PROFILAXIS ANTIMICROBIANA



■ Si ■ No

PPE



■ Si PPE ■ No PPE

Conclusiones

- La víctima suele ser mujer, las adolescentes constituyen el grupo principal en esta serie. Se observa un aumento de frecuencia en los últimos años en todos los grupos de edad.
- El agresor suele ser varón y mayor de edad, del entorno familiar en un 36%, principalmente en menores de 12 años.
- El hallazgo de lesiones en la EF es infrecuente, su ausencia no descarta el ASI.
- Es fundamental realizar un despistaje competo de ITS (11% de los casos en esta serie), y el desarrollo de protocolos específicos de actuación en la valoración inicial y el abordaje integral por parte de equipos multidisciplinares en unidades de referencia.