

INTENTOS AUTOLÍTICOS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19. CASUÍSTICA EN NUESTRO SERVICIO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.

Sena Herrero L., Junco Plana A., Mourelle Vázquez N., Prada Tellado M., González Paz H., González Rodríguez L., Sarmiento Carrera N., Fernández Cebrián SA.

Servicio de Pediatría Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- En los últimos años se ha registrado un aumento de fenómenos suicidas. Representan un elevado porcentaje de los ingresos urgentes, pasando a ser la segunda causa de muerte en la adolescencia.
- Presentamos un estudio que pretende conocer la incidencia de ingresos por intentos autolíticos en nuestra área sanitaria, e identificar qué factores pueden estar relacionados, así como estudiar si el incremento de casos percibido en el último año puede estar en relación con la situación de pandemia actual por COVID-19.

MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo que incluye a pacientes hasta los 15 años que requirieron ingreso por intento autolítico y conducta parasuicida desde el año 2018 al 2021. Se recogió información epidemiológica y se realizó el análisis estadístico a través del programa SPSS25.


RESULTADOS

N=45

Edad: mediana de 13.4 años


Sexo: 6.7% hombres / 93.3% mujeres

Sexo




■ Hombres ■ Mujeres

Histograma



RESULTADOS


Patología psiquiátrica previa



- Trastornos de ansiedad
- Trastornos del estado de ánimo
- Trastornos de la conducta alimentaria
- Trastornos de personalidad

RESULTADOS

Marco familiar




■ Desfavorable ■ Favorable ■ No valorable


- Núcleo familiar no estable
- Ausencia de figura paterna
- Patología psiquiátrica en los progenitores
- Residencia en un centro tutelado

RESULTADOS


Método empleado



■ Sobreingesta farmacológica ■ Autolesiones ■ Ingesta de productos químicos



RESULTADOS



INCIDENCIA ACUMULADA

2018 y 2029



17.203/10.000 habitantes/año

2020 y 2021



34.72/10.000 habitantes/año

CONCLUSIONES

Los casos de intentos autolíticos en niños y adolescentes son cada vez más frecuentes.

El perfil de mayor riesgo es el de una mujer adolescente con antecedentes psiquiátricos, y un ambiente familiar desfavorable, que realiza una sobreingesta farmacológica por primera vez sin intención suicida real.

Este problema parece haberse agravado desde el inicio de la pandemia por COVID-19, con una incidencia significativamente mayor en los dos últimos años frente a los dos años previos.