



VOMITOS EN NEONATO

Neonato de 4 días de vida, parto normal y ecografías prenatales normales, lactancia materna exclusiva. Acude a la consulta de pediatría del centro de salud por vómitos aislados tras todas las tomas desde hace 2 días, al comienzo de contenido alimenticio y en las últimas horas bilioso. Afebril. Deposiciones escasas con estímulo rectal.

Exploración física: abdomen globuloso, no se palpan masas ni megalias. Resto de exploración por aparatos normal. Pérdida ponderal del 10 %. Ante sospecha de obstrucción intestinal se deriva al servicio de Urgencias.

- Analítica sanguínea hemograma, gasometría capilar, PCR , coagulación. Hemocultivo negativos.
- Radiografía abdomen
- Ecografía abdominal: dilatación y contenido líquido en estómago duodeno y yeyuno proximal. Asas colapsadas distalmente.



Tránsito duodenal: se confirma la dilatación hasta yeyuno proximal donde se observa un cambio brusco de calibre.

Se procede a intervención quirúrgica urgente donde se evidencia **atresia intestinal tipo I membrana**.

CONCLUSIONES: La atresia yeyunal tipo I consiste en una membrana que ocluye por completo la luz de un intestino intacto y su tratamiento constituye una urgencia quirúrgica. El tabaquismo y el consumo de cocaína en la madre se asocian con mayor frecuencia. El pronóstico es bueno con una supervivencia > 90% .