

Intento e ideación autolítica en un Servicio de Urgencias Pediátricas antes y después de la pandemia


Marta Conde Sendagorta, Ana Pérez Villena, Ana Barrios Tascón, Gema Medina Calabria, María Tejado Castillo, Marta Plata Gallardo, María Fernández Pascual, Pablo Gómez Roca, Maria Luisa Herreros Fernández, Juana M^a Rizo Pascual.

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

SUICIDIO



2020
14 niños < 15 años



Aumento pandemia
SarsCov2



FR: Sexo femenino,
síntomas depresivos

OBJETIVOS




MÉTODOS

Ene 2019

Dic 2021

Criterios de inclusión



Variables

- Fecha de atención
- Motivo de consulta
- Seguimiento previo en CSM
- Medicación psicofarmacológica previa y al alta
- Motivo desencadenante
- Mecanismo de autolesión
- Valoración por psiquiatría
- Diagnósticos al alta
- Seguimiento en CSM
- Tiempo de estancia en urgencias
- Reconsultas
- Número de intentos autolíticos.

RESULTADOS (I)

Variable	N=87	
Sexo		
Mujeres	89.6%	
Edad (mediana)		
2019	14.6	RIQ 13,5-15,1
2020	14,9	RIQ 13,9-15,4
2021	13,5	RIQ: 12,5-14,6
	14,6	RIQ: 13,4-14,9
Motivo de consulta		
Ideación autolítica	25	
Intento autolítico	62	
Mecanismo		
Sobreingesta medicamentosa	36	
Precipitación	5	
Cortes	5	
Desencadenante		
Problema intrafamiliar	52%	
Acoso escolar	12%	
Problema relaciones sociales	12%	

RESULTADOS (II)

Variable	N=87	
Seguimiento previo CSM	57 (66%)	
Diagnósticos previos registrados	57	
Depresión	20	
Tr. adaptativo	11	
Tr. conducta	7	
Tratamiento psiquiátrico previo	38 (44%)	
Antidepresivos	29	
Benzodíacepinas	13	
Antipsicóticos	6	
Vistos por Psiquiatría	100%	
Estancia en Urgencias (mediana)	11 horas	RIQ 4-19
Ingresos	25	
Ingreso previo en nuestra unidad	10	

RESULTADOS (III)



Variable	N=87	
Seguimiento en CSM	83 (95%)	
Tratamiento farmacológico al alta	57 (65.5%)	
Reconsultas	25%	
Intento autolítico		RIQ 1-3
2019	22	
2020	12	
2021	27	
Ideación autolítica		
2019	5	
2020	5	
2021	16	

DISCUSIÓN

Evolución

Características

Cambio



CONCLUSIONES



- Se han **DUPLICADO** consultas de ideación/intento autolítico.
- Muestra **MÁS JOVEN** que la literatura.
- 1 de cada 4 pacientes han **RECONSULTADO** por dicho motivo.
- Urge aumentar **RECURSOS** en este área

GRACIAS

