

Teratoma congénito orofaríngeo

María Alejandra Rosario Verde, Isabel Barranco Fernández, Adoración González Carretero, Maria Alegre Viñas, Natalia Cerdeira Barreiro, Elisabet Espinosa de los Monteros Márquez

Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid

Introducción

El teratoma es el tumor de células germinales más frecuente. Se localizan fundamentalmente en las gónadas y el 95% son benignos. Es el tumor neonatal más común, habitualmente extragonadal. Presentamos un caso de teratoma en un recién nacido con clínica de obstrucción intermitente de la vía respiratoria superior.

Caso clínico

Recién nacido de sexo femenino con embarazo controlado, normal y parto a término con PAEG. A las 6 horas de vida tras vómito de contenido alimentario presenta sialorrea, ruido de secreciones, dificultad respiratoria y náuseas. Tras lavados nasales y aspiración de secreciones orofaríngeas precisa oxigenoterapia en gafas nasales por desaturaciones puntuales. A la exploración física se identifica en orofaringe masa redondeada de aspecto mucoso móvil que desaparece con la deglución y reaparece con el reflejo nauseoso. Resto de exploración física normal.

Es trasladada a un centro de referencia para valoración por servicio de Otorrinolaringología. Se realiza RNM de cuello y cavum donde se confirma la existencia de tumoración polipoidea procedente del pilar amigdalino izquierdo de 22 mm x 9,4 mm, que se encuentra compuesta por distintos tipos de tejido de apariencia mesenquimal que podría corresponderse como primera posibilidad diagnóstica con un teratoma de línea media también llamado epignatus. Se completó estudio con ecografía transfontanelar y abdominal sin hallazgos patológicos y marcadores tumorales normales (alfa-fetoproteína y BHCG normales). Se realiza intervención quirúrgica a los 3 días de vida con exéresis de la lesión, postoperatorio sin complicaciones. El estudio anatomopatológico confirma el diagnóstico de teratoma maduro de pilar amigdalino posterior izquierdo sin atipias ni regiones inmaduras.



Conclusiones

1. Los teratomas son un grupo de tumores heterogéneos derivados de las células germinales primitivas.
2. La incidencia se estima en 1/4000 recién nacidos vivos con una preferencia por el sexo femenino a razón de 3:1.
3. Los de localización extragonadal se presentan en la línea media siendo frecuente el área sacrococcigea, retroperitoneo, mediastino, cabeza y cuello y glándula pineal. Según su tamaño se pueden diagnosticar en etapa prenatal.
4. Los de localización orofaríngea pueden provocar obstrucción grave de la vía aérea al nacimiento, siendo importante el diagnóstico precoz.