

Trombosis de senos venosos y OMA: una complicación infrecuente

Diago Garcia B¹, Álvarez Martín M¹, Bernat Montoya V¹, Enrique Madrid S¹,
 Ferrer Hermenegildo M¹, Antón Almero L¹,
¹Hospital General Universitario de Castellón (Castellón)



INTRODUCCIÓN

La trombosis de senos venosos es una entidad poco frecuente, con una incidencia que varía entre 0,4 y 1 de cada 100.000 niños/año, apareciendo en casi el 50% en el periodo neonatal y el primer año de vida. Se estima que es una enfermedad infradiagnosticada, por lo que es importante considerarla en el diagnóstico diferencial de un trastorno neurológico agudo o subagudo.

CASO CLÍNICO


Niño de 2 años, sin antecedentes de interés, que consulta en urgencias por **somnolencia y cefalea hemicraneal** de 12 horas de evolución.

Fue valorado 48 horas antes por un cuadro de vómitos asociada a deshidratación leve autolimitados.

A la exploración física destaca una **disminución del nivel de alerta e hipoactividad**. Resto exploración física y neurológica normal.

Pruebas complementarias:

Analítica sanguínea	Análisis citoquímico y
Sedimento orina + tóxicos	microbiológico de LCR
Normales	




TC craneal urgente:

Hallazgos compatibles con proceso inflamatorio-infeccioso de origen otológico derecho.

MANEJO HOSPITALARIO:

RM cerebral con fase venosa:


Trombosis de seno venoso transversal derecho que se extiende hacia seno sigmoideo derecho y mínima extensión a seno transversal izquierdo.



Previo al tratamiento

Tratamiento:

Heparina de bajo peso molecular
 Tubos de drenaje transtimpánicos +
 Antibioterapia sistémica + tópica +
 Corticoterapia sistémica



Tras 10 días de tratamiento

Estudio de trombofilias:

Antitrombina	Factor V Leiden
Proteína C	Mutación
Proteína S,	Heterocigosis gen
Homocisteína	protrombina
Ac antifosfolípidos	G20210A

Evolución:

Favorable, con exploración neurológica normal. Tras 3 meses con HBPM: resolución total y repermeabilización de los senos venosos.

CONCLUSIONES

- Presentación atípica de una otitis media complicada con trombosis senos venosos.
- La trombosis de senos venosos es una entidad poco frecuente e infradiagnosticada. Debe considerarse en el diagnóstico diferencial trastornos neurológicos agudos y subagudos.
- Descartar la presencia de factores de riesgo protrombóticos e iniciar tratamiento profiláctico en situaciones indicadas.