

HOYUELOS EN EL RECIÉN NACIDO, ¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR DETRÁS?

Cristina Cabrera Corral, Elisenda Hernández García, Elena Rivera Sánchez, Gloria Viedma Chamorro, Julio Alberto Castañeda Mendieta, Elena Villatoro Leiva.
Complejo Hospitalario de Jaén

INTRODUCCIÓN

HOYUELOS

- Depresiones cutáneas que aparecen sobre prominencias óseas.
- Frecuentes en la infancia, hallazgos casuales.

- Número
- Localización
- Rasgos dismórficos
- Probable etiología
- Pruebas complementarias
- Tratamiento

- Mejillas: sin significado patológico.
- Localización nasal, preauricular, biacromial o múltiples articulaciones: fuerte asociación con **síndromes clínicos**.

¡ESTUDIO GENÉTICO!

- Zona sacra: disrafismo oculto.

¡ESTUDIO DE IMAGEN!

CASO CLÍNICO

RNPT (30+3 SG) PAEG (1450g). Embarazo controlado en alto riesgo por mioma uterino gigante y diabetes gestacional controlada con dieta y ejercicio. No ingesta de medicamentos. Serologías maternas negativas; rubéola inmune. SGB desconocido. Maduración pulmonar completa por amenaza de parto prematuro. Cesárea por presentación podálica.

EXPLORACIÓN FÍSICA

- Orejas de implantación baja
- Apéndice preauricular derecho
- Paladar ojival
- Dolicocefalia
- **Depresiones cutáneas** en borde externo de rodilla derecha, trocánter mayor del fémur derecho, escápula y codo derechos sin limitación articular

Las depresiones cutáneas aparecen en niños sanos, aunque pueden deberse a las causas descritas en la tabla 1. Dado que en nuestro paciente no existen antecedentes previos salvo mioma gigante, se afectan múltiples articulaciones y existen rasgos dismórficos menores se solicitó **exoma clínico** dirigido con resultado negativo, considerando los hoyuelos como probables hallazgos anodinos que han presentado buena evolución.

CAUSAS DE HOYUELOS CUTÁNEOS

Infecciones	Rubéola congénita
Traumatismos	Amniocentesis
Trastornos metabólicos	Hipofosfatasia
Fármacos en la gestación	Misoprostol, piridoxina, nitrofurantoína...
Trastornos mecánicos	Malformaciones uterinas
Síndromes malformativos congénitos	

Tabla 1. Causas de hoyuelos cutáneos




Imagen 1. Síndromes malformativos en función de localización del hoyuelo

CONCLUSIONES

- Ante la presencia de hoyuelos la función del pediatra es dilucidar, a través de la exploración física y exámenes complementarios, aquellos que pueden asociarse a condiciones patológicas.
- En la mayoría de los casos la actitud es conservadora junto a la observación de la evolución. Sin embargo, si aparecen reacciones cicatriciales, adherencias, signos de dolor o restricciones de la movilidad articular es preciso un tratamiento quirúrgico.