



LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CONTADA A TRAVÉS DE CUENTOS INFANTILES

Ibarra Rodríguez MR, Paredes Esteban RM, Murcia Pascual FJ,
Grijalva Estrada O, González Cayón J, Chaparro López CM.



Afrontamiento de la intervención



El miedo a lo desconocido: principal factor que hace al paciente pediátrico afrontar su intervención quirúrgica de una manera dramática.



Es fundamental que acepte del mejor modo posible su operación, ayudado tanto por parte de los profesionales como por parte de los padres.

OBJETIVO




Desdramatizar esta situación, disminuir el miedo y la ansiedad del paciente pediátrico y sus familiares, utilizando como estrategia de afrontamiento la explicación de la intervención a través de cuentos infantiles.



- Éxito cosechado debido a la puesta en marcha de una ruta quirúrgica
- Nuevas ideas que permitan conocer el proceso quirúrgico sin la necesidad de acudir físicamente al hospital (situación agravada en los últimos tiempos por las restricciones sanitarias).





Profesionales de la UGC Cirugía Pediátrica



¡HOLA!

¡Yo ya me he operado de hipospadias!


¡No te preocupes!

Voy a explicártelo todo a ti y a tus
papás

3



Es importante saber que, una vez diagnosticado, **NO DEBE SER CIRCUNCIDADO** puesto que la piel sobrante que se elimina en ese procedimiento puede necesitarse para la cirugía de corrección del hipospadias.



Sonda vesical



Sonda vesical en niños más mayores



Técnica del doble pañal



MEDICACIÓN

Como se ha comentado anteriormente, se pautará medicación (se cargará en su tarjeta sanitaria):

- Analgésicos: paracetamol, ibuprofeno
- Antibiótico: es importante tomarlos el número de días que se indica.
- Medicación para los espasmos: oxibutinina
- Laxantes: para mejorar la defecación.

- Autismo
- No fluidez lectora
- Necesidades especiales




Cuidando mi Port a Cath

UGC Cirugía Pediátrica



Hospital Reina Sofía. Córdoba Junio 2021

Colocación del Port a Cath



El port a Cath se coloca en quirófano por parte del equipo de Cirugía Pediátrica y con anestesia general mediante punción ecoguiada. Durante el procedimiento se realizan radiografías para comprobar la correcta colocación del mismo. El port a Cath va tapado con un apósito a la salida del quirófano y se curará en la planta por parte de enfermería según indicaciones de Cirugía Pediátrica.



Resultados y conclusiones



- ⊙ Disminuir la percepción hostil hacia el bloque quirúrgico
- ⊙ Aumenta la calidad asistencial y el nivel de confianza
- ⊙ Disminuye el estrés asociado a la intervención
- ⊙ Fuente de motivación y una mayor implicación en todas las fases del proceso quirúrgico.



Gracias



¿Alguna pregunta?