

Trombocitopenia inmune primaria en un hospital comarcal (2010-2021): nuestra experiencia.

Isabel Rodrigo Abril

Junio 2022

Hospital de Manises

Trombocitopenia inmune primaria


Trombocitopenia, principalmente periférica, con cifra de: <100.000 plaquetas/ μL .

SÍNTOMAS

- Sangrado mucocutáneo
- Epistaxis
- Hematuria
- Hemorragia digestiva
- Menorragia
- Gingivorragia

La mayoría de
pacientes
ASINTOMÁTICOS

TRATAMIENTO ACTUALIZACIÓN 2018



CRITERIOS DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO

- **REMISIÓN COMPLETA:** $\geq 100.000/\mu\text{L}$ durante más de 6 semanas post tratamiento.
- **REMISIÓN PARCIAL:** $30.000 - 100.000/\mu\text{L}$ durante más de 6 semanas post tratamiento.
- **AUSENCIA DE RESPUESTA:** No se modifica clínica ni biológicamente.
- **RESPUESTA TRANSITORIA:** Mejoría inicial con nueva clínica o recuento $< 30.000/\mu\text{L}$ antes de las 6 semanas tras tratamiento.
- **RECAÍDA:** $< 30.000/\mu\text{L}$ tras 6 semanas de haber finalizado el tratamiento, habiéndose obtenido anteriormente una remisión completa o parcial.


OBJETIVOS

- Conocer la incidencia de la PTI en nuestro Departamento de Salud.
- Describir las características epidemiológicas, clínicas, el tratamiento y la evolución, de los casos de PTI diagnosticados en un hospital comarcal en los últimos 11 años (2010-2021).

RESULTADOS

	EDAD	SEXO	MES DEBUT	PLAQUETAS (PLT) DEBUT	TRATAMIENTO DEBUT	PLT ALTA	TRATAMIENTO 2º EPISODIO
1	7 años	Varón	Octubre	27.000	No	53.000	-
2	2 años	Mujer	Septiembre	8.000	Corticoterapia IV	34.000	-
3	2 años	Mujer	Noviembre	10.000	Corticoterapia IV	105.000	-
4	7 años	Mujer	Noviembre	45.000	Corticoterapia IV	45.000	Corticoterapia IV
5	9 años	Mujer	Abril	33.000	No	81.000	-
6	4 años	Mujer	Abril	17.000	No	150.000	-
7	3 años	Varón	Noviembre	17.000	No	77.000	-
8	2 años	Varón	Noviembre	14.000	No	45.000	-
9	2 años	Mujer	Febrero	11.000	No	47.000	No
10	2 años	Mujer	Noviembre	5.000	Corticoterapia IV	40.000	Corticoterapia IV + Inmunoglobulina IV
11	5 años	Mujer	Agosto	4.000	Corticoterapia IV + Inmunoglobulina IV	28.000	-
12	11 años	Varón	Febrero	6.000	Corticoterapia IV	182.000	Corticoterapia IV + Inmunoglobulina IV
13	3 años	Mujer	Abril	34.000	Corticoterapia IV	191.000	-
14	2 años	Varón	Diciembre	7.000	Corticoterapia IV	181.000	-

RESULTADOS



RESULTADOS

TRATAMIENTO 1ª LÍNEA:

Corticoterapia IV



TRATAMIENTO 2ª LÍNEA:

Inmunoglobulina IV



TRATAMIENTO 3ª LÍNEA:

Agonistas del receptor de la trombopoyetina

CONCLUSIONES

- La mayoría de casos de trombocitopenia inmune primaria, son leves, siendo asintomáticos o presentado clínica exclusivamente cutánea.
- Es una patología de predominio estacional en invierno con probable relación con infecciones víricas recientes.
- Un elevado porcentaje de los casos remite espontáneamente, lo que apoya las estrategias conservadoras de los protocolos actuales.

MUCHAS GRACIAS