

Uveítis en la edad pediátrica: Estudio descriptivo

B. Salamanca Zarzuela ¹, J.V. Pernía Sánchez ¹, M. Antoñón Rodríguez ¹, E. Vallejo Vicente ², M Yolanda Cordero Pérez ², F. Centeno Malfaz ¹


¹ Servicio de Pediatría. ² Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

Los autores declaran no tener conflictos de intereses

INTRODUCCIÓN


Uveítis en la edad pediátrica: Estudio descriptivo

- La uveítis en edad pediátrica presentan una etiología heterogénea.
- La mayoría de casos son idiopáticos, pero pueden asociarse a procesos inflamatorios sistémicos o infecciones.
- El tratamiento de la uveítis no infecciosa es un abordaje gradual, cuyo principal objetivo es evitar las complicaciones propias de la enfermedad, que a menudo son graves y conducen a daños estructurales irreversibles y discapacidad visual significativa.



OBJETIVOS

1. Conocer las características clínico-epidemiológicas de los pacientes pediátricos con uveítis en seguimiento por nuestro servicio
2. Describir la evolución de dichos pacientes




MÉTODOS

- Estudio observacional descriptivo
- Menores de 14 años actualmente en seguimiento en consultas externas de pediatría con diagnóstico de uveítis en un hospital de tercer nivel

RESULTADOS

Uveítis en la edad pediátrica: Estudio descriptivo



Edad media: 10 años 1 mes

RESULTADOS

Uveítis aislada



Uveítis en la edad pediátrica:
Estudio descriptivo

♂ 11a	♀ 13 a	♂ 11 a	♂ 9 a	♀ 9 a	♂ 8 a
UAA bilateral	UAA bilateral	Panuveítis anterior bilateral	Panuveítis derecha	UAA bilateral + papilitis	Pars planitis
ANA – y HLA B27 –					
Post-mycoplasma	IDIOPÁTICAS				
Azitromicina	MTX	Corticoide tópico + oral	MTX	MTX	MTX + Adalimumab

RESULTADOS Artritis idiopática juvenil

Uveítis en la edad pediátrica:
Estudio descriptivo

- Manifestación extraarticular más frecuente de AIJ (10-30%)
- Clínicamente asintomática
- Curso indolente, crónico y generalmente agresivo





RESULTADOS

Complejo TINU

Uveítis en la edad pediátrica: Estudio descriptivo

- Complejo TINU: nefritis tubulointersticial aguda con uveítis crónica
- Diagnóstico diferencial en fiebre de origen desconocido
- Entidad muy poco frecuente



RESULTADOS

Uveítis en la edad pediátrica:
Estudio descriptivo


Síndrome de Vogt-Koyangi-Harada

- Panuveítis granulomatosa bilateral y difusa que cursa frecuentemente con desprendimiento seroso de retina
- Puede asociar afectación del sistema nervioso central, alteraciones dermatológicas y auditivas

♀ 12a

Uveítis granulomatosa

Corticoide sistémico



CONCLUSIONES

- La uveítis en edad pediátrica puede ser diagnosticada durante el seguimiento de una enfermedad previamente conocida o ser el primer síntoma de una enfermedad sistémica.
- Debe realizarse un seguimiento regular para detectar complicaciones de su enfermedad junto a un control de posibles efectos adversos, tanto sistémicos como oculares.
- El objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de complicaciones visuales y evitar el impacto de la pérdida de visión en el niño y su familia.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN