

ALGO MÁS QUE UNA SOSPECHA DE ARTRITIS EN UN LACTANTE

Altuna Pérez, Nerea ¹. Cerezo Corredera, Silvia ². Pérez Estévez, Elena ³.

^{1,2} Médico interno residente Pediatría y áreas específicas

³ Médico adjunto Pediatría y áreas específicas (Pediatría Hospitalaria)

Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Vizcaya).

INTRODUCCIÓN

- La **patología osteoarticular** en los lactantes es algo bastante frecuente en la práctica clínica pediátrica.
- La forma de presentación incluye signos y síntomas diversos como febrícula o fiebre, irritabilidad, o rechazo del uso de la extremidad afectada, clínica inespecífica que podemos encontrar también en otras patologías.
- Por ello, su diagnóstico supone muchas veces un reto para los pediatras.
- A continuación, se presenta el caso de un lactante de 5 meses sin antecedentes personales ni familiares de interés con sospecha inicial de infección osteoarticular, y cuya evolución y pruebas complementarias demostraron la existencia de otra patología, la hemofilia A.

RESUMEN DEL CASO

MOTIVO DE CONSULTA

Febrícula + irritabilidad + menor movilidad de la pierna izquierda.

- No traumatismo previo.
- No síntomas catarrales o digestivos actuales, ni en días previos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Actitud en flexión de la pierna.


Llanto a la flexo-extensión del tobillo.

Eritema en piel suprayacente del tobillo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



PCR 0,18 mg/L
VSG 4 mm
Leucocitos 10.300; Neutrófilos 3.140 (30,50%)
Linfocitos 5.900 (57,3%)



Moderado derrame en articulación tibioastragalina, de aspecto complicado

SOSPECHA DE INFECCIÓN OSTEOARTICULAR

EVOLUCIÓN

HEMOFILIA A

Se repite analítica:

TPPA *56sg

TP 79%

TT 14 sg

Fibrinógeno 217mg/dL

Factor VIII 2,1%

Se repite ecografía:
Persiste derrame compatible con hemartros

¿Trastorno de la coagulación?

Evolución favorable:
Afebril y mejoría de la movilidad del tobillo

Ingreso con amoxicilina-clavulánico intravenoso

CONCLUSIONES

- El debut de una hemofilia moderada o grave se puede manifestar como sangrado articular en un lactante
- Hemos de considerarlo dentro del diagnóstico diferencial de una infección osteoarticular, a pesar de que la frecuencia de esta enfermedad sea baja.
- Su confirmación es sencilla y el abordaje conjunto inicial con un servicio de hematología con experiencia en este grupo de pacientes es fundamental para informar a la familia sobre futura evolución de la enfermedad.