

Evaluación de las estrategias en la prevención de la transmisión materno-infantil del VHB

Enrique Pazos Coronado

Hospital Universitario Parc Tauli. Sabadell. Barcelona

INTRODUCCIÓN

- La hepatitis B (VHB) supone importante problema salud pública mundial
- La OMS tiene como objetivo la erradicación de las hepatitis virales en 2030
- La transmisión perinatal es el principal mecanismo de transmisión
- Presenta una alta tasa de cronificación en los niños
- Cribado de VHB gestacional, el tratamiento antiviral periparto y la inmunoprofilaxis del recién nacido (seguimiento)


OBJETIVOS

- Analizar el cumplimiento de las estrategias de prevención de transmisión vertical
- Identificar limitaciones para la aplicación de las recomendaciones internacionales


MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historia clínica
- Recién nacidos hijos de madre con VHB positivo nacidos durante los años 2018-2021


RESULTADOS (I)



Cribado gestacional VHB



Origen materno



77% Seguimiento por hepatología






40% Barrera idiomática

2 gestantes cumplían
criterios de tratamiento
antiviral




Únicamente lo cumplió
una paciente.

RESULTADOS (II)



Calendario vacunal



CONCLUSIONES

- Se observó retraso en el cribado secundario a un control tardío gestacional
- La determinación se realizó en todos los casos previo a la semana 28 gestacional
- Se identificó de forma correcta gestantes tributarias a tratamiento antiviral
- La inmunoprofilaxis se cumplió con una elevada tasa en el recién nacido
- Elevado absentismo al seguimiento por especialista atribuido a barrera idiomática
- Es necesario implantar estrategias para un correcto seguimiento

¡ Muchas gracias!

epazos@tauli.cat