

Estudio descriptivo de la patología psiquiátrica en relación con la pandemia por SARS-CoV-2

Santos Martín, MT; Gil Suárez, Á; Torres Rico, M; Baquero Gómez, C; Croché Santander, FB; Torres del Pino, M.

Pediatría. Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva)

Introducción y objetivos



- Los trastornos de salud mental infanto – juvenil (SMIJ):
 - En España: prevalencia 1/100
 - Mayor en varones, excepto depresión y ansiedad
- Los trastornos psiquiátricos: **infradiagnosticados e infratratados**
 - Servicio de urgencias: lugar primordial para la atención de primeros episodios
 - Enlace entre atención primaria y psiquiatría
- Trastornos más habituales:
 - Trastornos del comportamiento
 - Déficit de atención e hiperactividad
 - Trastornos de ansiedad
 - Agitación psicomotriz
 - Crisis de angustia
 - Intentos autolíticos

Factores
predisponentes

Suicidio: entre las primeras causas de
muerte en adolescentes

Introducción y objetivos



- Infección por SARSCoV – 2 en niños y adolescentes:
 - Menor en frecuencia y gravedad
 - Efectos indirectos por el confinamiento, medidas de prevención y cierre de colegios
 - Impacto negativo en su bienestar y salud → incremento de demanda por patologías psiquiátrico – infantil

Objetivos:

- Conocer la prevalencia de la patología psiquiátrica en urgencias y la influencia de la pandemia
- Comparar la incidencia estratificada por patología
- Analizar la edad, diferencia entre sexos y patología psiquiátrica y tratamiento previo

Métodos



- Estudio observacional descriptivo retrospectivo
 - Pacientes menores de 14 años atendidos en urgencias de pediatría de nuestro centro
 - Octubre 2018 a diciembre 2021

Variables

Edad

Sexo

Seguimiento en USMIJ

Patología previa psiquiátrica

Tratamiento psiquiátrico previo

Diagnóstico al alta

Resultados

Total de consultas	157 pacientes	
	Prepandemia	Postpandemia
Nº consultas	80 consultas	77 consultas
Media de consultas	36,2 pacientes/año	42,9 pacientes/año
Prevalencia del total de urgencias	0,14%	0,23%
Sexo	Mujer: 37 (46,25 %)	Mujer: 45 (58,44 %)
	Varón: 43 (53,75 %)	Varón: 32 (41,56 %)
Edad (mediana)	11 años	12 años
Seguimiento en USMIJ	32 (40 %)	33 (42,85 %)
Tratamiento previo	20 (25 %)	26 (33,76 %)

Tabla 1. Resultados

Resultados

Estratificación de diagnósticos al alta

	Prepandemia	Postpandemia
Crisis de ansiedad	52 (65 %)	52 (67,5 %)
Trastornos de conducta	20 (25 %)	11 (14,3 %)
Heteroagresividad	6 (7,5 %)	5 (6,4 %)
Intentos autolíticos	2 (2,5 %)	9 (11,7 %)

Tabla 2. Estratificación de diagnósticos al alta

Ingesta medicamentosa
1 caso reincidente en
paciente diabético con
insulina

Resultados

Estratificación de diagnósticos al alta por sexo




Gráfico 1. Diagnósticos al alta pre y postpandemia según sexo

Conclusiones



- La patología psiquiátrica es un motivo cada vez más frecuente de consultas en urgencias pediátricas
 - Escasez de recursos comunitarios
 - Incremento de factores de riesgo
- Hemos observado un incremento de los motivos de consulta relacionadas con la salud mental tras la pandemia en nuestro centro
- Importante aumento de intentos autolíticos, sobretudo en mujeres
 - Ingestas medicamentosas
- Las consecuencias indirectas en la salud mental por la pandemia precisa una reevaluación de los programas de tratamiento y prevención
 - Atención adecuada de estos pacientes desde el primer momento en el que consultan

¡ Gracias !

