



Análisis de las sedaciones realizadas por pediatras en pacientes para procedimientos de Cirugía Menor de Dermatología

Marta Fernández Ruiz-Morote, Sonia Vázquez Greciano, Antonio Prisco Melero Guardia, María Dolores Mendoza
Cembranos, Hugo Monelo Rodríguez, José Fernández-Cantalejo Padial

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid






DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES

Análisis de las sedaciones realizadas por pediatras en pacientes para procedimientos de Cirugía Menor de Dermatología

Relativas a esta presentación no existen relaciones que podrían ser percibidas
como potenciales conflictos de intereses



Protocolo de sedoanalgesia



Protocolo de sedoanalgesia

- 1. Evaluación previa**
 - Anamnesis ——— AMPLE
 - Exploración física ——— FC – TA – FR – SatO₂
Auscultación cardiopulmonar
- 2. Elección fármacos**
Pediatra responsable → Según dolor y grado sedación objetivo
- 3. Monitorización continua** → Escala sedación H. Niño Jesús
FC – TA – FR – SatO₂
Efectos adversos
- 4. Evaluación posterior** → recuperación completa



v. 2021

Pediatra
Dermatólogo
Enfermería
Familiar
Paciente

¿Satisfacción?




Elección de fármacos

	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
	Levemente doloroso o sedación leve	Moderado-intensamente doloroso o si requiere sedación moderada
FÁRMACO Y VÍA ADMINISTRACIÓN	Óxido nitroso • Inhalado Midazolam (coadyuvante) • Nasal • IV/IM • Oral • Bucal	Ketamina IV +/- Midazolam IV (coadyuvante) Fentanilo IV +/- Midazolam IV (coadyuvante) Ketamina IV + Propofol IV Propofol IV + Fentanilo IV




Tipos de procedimientos




Fármacos y vías de administración

Fármacos



- Óxido nítrico (72,6 %)
- Ketamina (11,8 %)
- Nitroso y midazolam (6,3 %)
- Midazolam (5,1 %)
- Nitroso, midazolam y fentanilo (2,1%)
- Midazolam y fentanilo (1,3%)

Vía de administración




- Inhalada (72,6 %)
- Intramuscular (11,4 %)
- Inhalada y nasal (8,4 %)
- Nasal (5,9 %)
- Intravenoso (0,8 %)
- Oral e inhalado (0,8%)



Seguridad y efectos adversos

Tasa efectos adversos: 6%



Efectividad y satisfacción

Global: 97,4%



Pediatra que seda

96,6%




Dermatólogo que
realiza la técnica

98%



Enfermero

97%



Familiares

97,5%



Paciente

81,4%



Gracias por su atención

