



DECLARACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERESES

Características epidemiológicas y clínicas en el debut de la artritis idiopática juvenil: Un estudio retrospectivo.

María Mesa Ciruelo. Laura Trujillo Caballero. Ana Gámez Belmonte. Beatriz Bravo Mancheño.

Hospital Materno-Infantil. Granada

No se declara conflicto de interés por parte de ningún autor.



INTRODUCCIÓN.

La artritis idiopática juvenil (AIJ) engloba un **conjunto heterogéneo de artritis inflamatorias crónicas pediátricas**, clasificándose según los criterios aún vigentes ILAR 2001 ⁽¹⁾.

<u>Criterios de clasificación</u>	<u>Clasificación</u>
Artritis de inicio antes de los 16 años.	• AIJ sistémica
Más de 6 semanas de duración.	• AIJ oligoarticular persistente
Causa desconocida.	• AIJ oligoarticular extendida
	• AIJ poliarticular FR negativo
	• AIJ poliarticular FR positivo
	• Artritis psoriásica
	• Artritis relacionada con entesitis
	• AIJ indiferenciada

Criterios de inclusión y exclusión

CLÍNICA ACOMPAÑANTE
AFECTACIÓN
EXTRAESQUELÉTICA
NÚMERO DE ARTICULACIONES
AFECTADAS
ENTESITIS

ESTADO SEROLÓGICO FR


**Antecedentes de infecciones
y enfermedades autoinmunes**

INTRODUCCIÓN.



Tasas de incidencia global estimadas de 1,6 a 23 por 100.000

Tasas de prevalencia global estimadas de 3,8 a 400 por 100.000 (2,3).



Conocer su forma de presentación facilita el diagnóstico temprano, crucial para el pronóstico.

OBJETIVO

Describir las variables demográficas y clínicas de los pacientes con AIJ al debut de la enfermedad.




METODOLOGÍA

Diseño: Estudio descriptivo observacional retrospectivo.

Población de estudio: Pacientes de un servicio de Reumatología Pediátrica Hospital de tercer nivel.

Criterios de inclusión: Pacientes con debut de AIJ entre los años 2018-2023.




Variables: Sexo, edad, evolución hasta estudio por Reumatología, clasificación, perfil de autoinmunidad y clínica al debut.






RESULTADOS

Sexo



Edad



Media 7,7 años


Tiempo de derivación desde inicio de los síntomas

Para **AIJ sistémica**, la media se encuentra en **25 días** y la mediana en 20 días, con un **rango entre 14 y 60 días**.

Para el resto de grupos de AIJ, la media se sitúa en **11,92 meses** y la mediana en 2 meses, con un **rango de entre 15 días y 2 años**.

RESULTADOS


Clasificación



	N	%	Artritis	Fiebre	Muco cut	Uveitis	Bilateral	Unilateral	ANAs (+)	HLA B27
AIJ sistémica	7	16,7	4	7	2	0			3	
AIJ oligoarticular	18	42,9	18		1	3	1	2	13	2
AIJ poliarticular FR (+)	4	9,5	4			0			1	
AIJ poliarticular FR (-)	9	21,4	9			0			3	
Artritis relacionada con entesitis	4	9,5	3			1		1	1	3
	42	100	38	7	3	4			21	5
			90,5 %	16,7 %	7,2 %	9,5 %			50 %	12 %



CONCLUSIONES




(1)

MENOR DE 16 AÑOS

INFLAMACIÓN
LIMITACIÓN FUNCIONAL - RIGIDEZ
DOLOR

EN UNA O MÁS ARTICULACIONES

AIJ



INFECCIONES

TRAUMATISMOS

SINOVITIS TRANSITORIA

FRACTURAS

METABÓLICAS

TUMORES

AUTOINFLAMATORIAS

CONCLUSIONES

1. SOSPECHA DIAGNÓSTICA

- FORMACIÓN - VISIBILIDAD -



2. DIAGNÓSTICO PRECOZ

INICIO DEL TRATAMIENTO - EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA

Objetivo:

**REMISIÓN CLÍNICA: INFLAMACIÓN 0
PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO Y SECUELAS**



GRACIAS

